

COMPRESSIOS CSIGOLYATEST TÖRÉSEK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI – AHOGYAN MI VÉGEZZÜK

Dr.Gati András, Dr.Viola Árpád PhD.

Országos Traumatológiai Intézet Idegsebészeti Osztály

Összefoglaló: Osztályunkon, az Országos Traumatológiai Intézet Idegsebészeti Osztályán évente közel ezer csigolyatest törést elszenvedett beteg kezelését végezzük. Eseteink jelentős részét képezik a thoracolumbalis szakaszra lokalizált, időskori – akár minimális traumára elszenvedett – osteoporosis talaján kialakuló compressios csigolyatest törések.

Munkaközösségünk által kidolgozott és bevezetett kezelési protokoll alapján hosszútávú betegkövetést végzünk; a paciens aktuális státusza valamint a törés CT felvételen ábrázolódó morphometriai jellemzői alapján konzervatív kezelést vagy műtéti ellátást biztosítunk. A műtéti technika az elmúlt évtizedekben jelentős változásokon ment át, a minimál invazív gerincsebészeti beavatkozások térhódításával lehetőség nyílt kiterjeszteni az operábilis paciensek körét, így minimális műtéti terheléssel a compressios törés talaján fellépő fájdalom jelentős mértékben csökkenthető, növelve a beteg életszínvonalát. A percutan vertebroplastica valamint komplex, csontcementtel augmentált minimálisan invazív dorsalis transpedicularis stabilizáció eddigi tapasztalatink szerint megfelelő methodikát biztosítanak az időskori compressios törések műtéti ellátásában.

Kulcsszavak: compressios csigolyatest törés, konzervatív kezelés, corsette, minimál invazív gerincsebészet, percutan vertebroplastica, percutan transpedicularis stabilizáció